УДК: 615.21:519.876.5: 577.29 ГРНТИ: 76.03.29

DOI: 10.32415/jscientia.2019.03.01

ИЗУЧЕНИЕ СРОДСТВА N-АЦИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2-ОКСО-1-ПИРРОЛИДИНАЦЕТАМИДА К САЙТУ СВЯЗЫВАНИЯ NMDA-РЕЦЕПТОРА МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА

А. С. Чиряпкин , А. А. Глушко, И. П. КодонидиВолгоградский государственный медицинский университет
Россия, 357532 г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

✉ Чиряпкин Алексей Сергеевич – alexey.chiriapkin@yandex.ru

Поиск новых соединений, обладающих высокой ноотропной биологической активностью, является перспективным научным направлением. Современным вычислительным методом прогнозирования фармакологической активности у изучаемых соединений является молекулярный докинг. Целью работы является исследование сродства новых N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида к сайту связывания NMDA-рецептора с целью поиска новых эффективных ноотропных лекарственных препаратов. В качестве объектов исследования были использованы новые N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамида, рацетамы, глутамат и виртуальная модель NMDA-рецептора организма *Rattus norvegicus* с идентификационным кодом 2A5S из базы данных RCSB PDB. Результаты проведенного вычислительного эксперимента говорят о наличии высокой ноотропной биологической активности у исследуемых соединений. Наибольшим сродством из N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида к сайту связывания NMDA-рецептора обладает соединение 3. Таким образом, считаем целесообразным проведение фармакологических *in vivo* исследований данных соединений на предмет наличия ноотропной биологической активности.

Ключевые слова: 2-оксо-1-пирролидинацетамид, N-ацильные производные, NMDA-рецептор, молекулярный докинг, сайт связывания, биологическая активность, прогноз.

STUDY OF THE AFFINITY OF N-ACYL DERIVATIVES OF 2-OXO-1-PYRROLIDINE ACETAMIDE TO THE BINDING SITE OF NMDA RECEPTOR BY MOLECULAR DOCKING METHOD

A. S. Chiriapkin , A. A. Glushko, I. P. KodonidiVolgograd Medical State University
11 Kalinin Ave., 357532 Pyatigorsk, Russia

✉ Chiriapkin Alexey – alexey.chiriapkin@yandex.ru

The search for new compounds with a high nootropic biological activity is a promising scientific direction. A modern computational method for predicting pharmacological activity of the studied compounds is the molecular docking. The aim of this work is to study the affinity of new N-acyl derivatives of 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide to the binding site of NMDA receptor to search of new effective nootropic drugs. As objects of study, there are used the new N-acyl derivatives of 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide, racetams, glutamate and a virtual model of NMDA receptor of organism *Rattus norvegicus* with an identification code 2A5S from the RCSB PDB database. The results of the computational experiment indicate the presence of high nootropic biological activity in the compounds under study. Substance 3 has the greatest affinity of the N-acyl derivatives of 2-oxo-1-pyrrolidineethanol to the binding site of NMDA receptor. Thus, we consider it is appropriate to conduct pharmacological *in vivo* studies of these compounds for the presence of nootropic biological activity.

Keywords: 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide, N-acyl derivatives, NMDA receptor, molecular docking, binding site, biological activity, predict.

Введение. Ноотропные лекарственные препараты (ноотропы) – это обширная группа лекарственных препаратов, которая используется в ходе терапии различных патологических состояний и заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Лекарственные препараты данной фармакологической группы улучшают метаболические процессы в нейронах, нормализуют процессы кровообращения в тканях головного мозга, а также повышают устойчивость ЦНС к негативным внешним и внутренним воздействиям. В результате такого комплексного воздействия ноотропов на ткани головного мозга у человека происходит улучшение когнитивных способностей мозговой деятельности.

Одним из рецепторов, с помощью которого реализуется регуляция работы ЦНС, является NMDA-рецептор. Эти рецепторы принимают участие в процессах возбудимости нервной ткани, а также формируют синаптическую пластичность. Активирующим воздействием на NMDA-рецептор оказывают такие биогенные стимуляторы, как глутамат, ас-

партат и N-метил-D-аспартат. NMDA-рецептор относится к классу глутаматных рецепторов [1, 2].

Современным методом прогнозирования наличия и выраженности определенной биологической активности у исследуемых соединений является молекулярный докинг. Данный вычислительный эксперимент основан на поиске наиболее выгодной ориентации низкомолекулярного соединения в выбранной области моделирования рецептора или фермента. При этом представляется возможным изучить с какими аминокислотами образует связи лиганд в процессе взаимодействия с сайтом связывания белковой мишени [3].

Цель работы. Исследование сродства новых N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамида к сайту связывания NMDA-рецептора с целью поиска новых эффективных ноотропных лекарственных препаратов.

Материалы и методы. В качестве объектов для прогнозирования биологической активности в отношении

NMDA-рецептора были выбраны синтезированные на кафедре органической химии ПМФИ – филиала ВолГМУ N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинаацетамида. Это N-ацетил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид (1), N-пропаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид (2) и N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид (3) [4, 5]. Для сопоставления результатов сродства новых N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинаацетамида к сайту связывания NMDA-рецептора методом молекулярного докинга использовались глутамат и следующие рацетамы: пирацетам, анирацетам, оксирацетам, фонтурацетам и леветирацетам.

Рисунок 1. Структурные химические формулы N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинаацетамида

Ранее ученые Furukawa H., Singh S.K., Mancusso R. и Gouaux E., проводя рентгеноструктурный анализ комплекса субъединицы NR2A NMDA-рецептора с глутаматом, установили с какими аминокислотами сайта связывания NMDA-рецептора вступает во взаимодействие молекула глутаминовой кислоты. Это аминокислоты Ser 114, Thr 116, Arg 121, Ser 173 и Thr 174. Наличие связей низкомолекулярных соединений с данными аминокислотами необходимо для реализации активирующего действия на глутаматный рецептор [6].

С целью изучения взаимодействия низкомолекулярных соединений с сайтом связывания глутамата NMDA-рецептора была использована пространственная структура белок-лигандного комплекса организма *Rattus norvegicus* с идентификационным кодом 2A5S. В качестве лиганда в нем выступает молекула глутаминовой кислоты. Данный белок-лигандный комплекс был представлен в базе данных RCSB Protein Data Bank (rcsb.org) [7].

Пространственные структуры всех веществ, участвующих в исследовании, были построены в программе HyperChem 6.09. В этой же программе проведена оптимизация геометрии методом молекулярной механики MM+ [8]. В дальнейшем было проведено исследование взаимодействия лигандов с сайтом связывания NMDA-рецептора методом молекулярного докинга. Для этих целей использовалась программа Molegro Virtual Docker 6.0.1, в которой используется один из самых точных алгоритмов оценки лиганд-рецепторного сродства. Программа Molegro Virtual Docker обеспечивает более высокую точность расчёта белково-лигандных взаимодействий, чем многие другие современные программы осуществления молекулярного докинга [9, 10]. Областью проведения молекулярного докинга выступала сфера с радиусом 12 Å со следующими координатами: x = 16.42, y = 24.78, z = 37.16. В качестве функции подсчета энергии лиганд-рецепторного взаимодействия была выбрана MolDock Score [GRID] с разрешением

grid 0,30 Å. В результате проведенного молекулярного докинга было получено 200 вариантов образования молекулярного лиганд-рецепторного комплекса для каждого исследуемого соединения.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного вычислительного эксперимента были определены наиболее энергетически выгодные расположения исследуемых соединений в сайте связывания NMDA-рецептора. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Минимальное значение энергии взаимодействия исследуемых соединений с сайтом связывания NMDA-рецептора

Лиганд	Минимальная энергия лиганд-рецепторного взаимодействия, ккал/моль
1	-109.5360
2	-117.4930
3	-120.5520
Пирацетам	-90.5526
Анирацетам	-114.0780
Глутамат	-99.4834
Леветирацетам	-103.3600
Оксирацетам	-94.3876
Фонтурацетам	-120.8060

Результаты молекулярного докинга (табл. 1) свидетельствуют о том, что все три N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинаацетамида обладают высоким сродством к сайту связывания NMDA-рецептора. По минимальной энергии лиганд-рецепторного взаимодействия они превосходят молекулы пирацетама, глутамата, леветирацетама и оксирацетама. Стоит отметить, что по мере удлинения N-ацильного заместителя происходит увеличение сродства N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинаацетамида к сайту связывания NMDA-рецептора. Соединением лидером из них является вещество 3-N-бутаноил-2-(2-оксициклопентил)-ацетамид. Анирацетам за-

Рисунок 2. Расположение соединения 1, 2, 3 и глутамата в сайте связывания NMDA-рецептора согласно результатам молекулярного докинга

нимает более энергетически выгодное расположение в сайте связывания NMDA-рецептора, чем молекула соединения 1. Из изучаемых соединений наименьшую энергию лиганд-рецепторного взаимодействия имеет фонтурецетам, но следует отметить, что данное соединение превосходит по ней соединение 3 только на 0,254 ккал/моль. На рисунке 2 показано наиболее энергетически выгодные расположения N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамидов и глутаминовой кислоты по результатам молекулярного докинга в сайте связывания NMDA-рецептора. На данном рисунке обозначены аминокислоты Ser 114, Thr 116, Arg 121, Ser 173 и Thr 174, с которыми взаимодействует молекула глутамата в сайте связывания NMDA-рецептора согласно данным рентгеноструктурного анализа.

На рисунке 2 видно, что аминокислоты Ser 114, Thr 116, Arg 121, Ser 173 и Thr 174 сайта связывания NMDA-рецептора находятся близко с исследуемыми молекулами. Таким образом, можно говорить, о возможности взаимодействия изучаемых соединений с данными аминокислотами, что обуславливает наличие у них активирующего действия на глутаматный рецептор.

Заключение. По результатам проведенного вычислительного эксперимента было установлено, что все три N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамидов обладают высоким сродством к сайту связывания NMDA-рецептора. При этом по минимальной энергии лиганд-рецепторного взаимодействия они превосходят молекулы пиррацетама, глутамата, леветирацетама и оксирацетама. Наибольшим сродством из N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамидов к сайту связывания NMDA-рецептора обладает соединение 3. Анирацетам занимает более энергетически выгодное расположение в сайте связывания NMDA-рецептора, чем молекула соединения 1. Соединение 3 уступает по минимальной энергии лиганд-рецепторного взаимодействия с сайтом связывания NMDA-рецептора от фонтурецетама на 0,254 ккал/моль. Таким образом, из полученных данных вычислительного эксперимента следует, что синтезированные N-ацильные производные 2-оксо-1-пирролидинацетамидов могут обладать высокой ноотропной активностью. Считаем целесообразным проведение фармакологических *in vivo* исследований данных соединений на предмет наличия ноотропной биологической активности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Машковский М.Д. *Лекарственные средства*. 15-е изд. М.: Новая Волна; **2005**. [Mashkovskiy MD. *Lekarstvennyye sredstva*. Moscow: Novaya Volna; **2005**. (in Russ).]
2. Бурчинский С.Г. *Ноотропы: классификация, механизмы действия, сравнительная характеристика фармакологических свойств*. Киев: **2004**. [Burchinskiy SG. *Nootropy: klassifikatsiya, mekhanizmy deistviya, sravnitel'naya kharakteristika farmakologicheskikh svoistv*. Kiev; **2004**. (in Russ).]
3. Глушко А.А., Воронков А.В., Кодониди И.П., и др. Молекулярный докинг N-замещенного производного изохинолона с каталитическим доменом C // *Фармация и фармакология*. **2014**. Т. 2. № 1(2). С. 3-7. [Gloushko AA, Voronkov AV, Kodonidi IP, et al. *Molecular docking of N-substituted derivative of isoquinoline with catalytic domain of protein kinase C*. *Pharmacy & Pharmacology*. **2014**;2(1(2)):3-7. (in Russ).] doi: 10.19163/2307-9266-2014-2-1(2)-3-7.
4. Кодониди И.П., Чиряпкин А.С., Аненко Д.С. Компьютерное изучение спектра биологической активности N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамидов // *Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов*. Пятигорск: РИА-КМВ; **2018**. Вып. 73. [Kodonidi IP, Chiriapkin AS, Anenko DS. *Komp'yuternoe izuchenie spektra biologicheskoi aktivnosti N-atsil'nykh proizvodnykh 2-okso-1-pirrolidinacetamida*. In: *Razrabotka, issledovanie i marketing novoi farmatsevticheskoi produktsii*. Pyatigorsk: RIA-KMV; **2018**. Issue 73. (in Russ).]
5. Чиряпкин А.С., Кодониди И.П., Аненко Д.С. Разработка методики качественного анализа N-ацильных производных 2-оксо-1-пирролидинацетамидов методом тонкослойной хроматографии // *Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов*. Пятигорск: РИА-КМВ; **2018**. Вып. 73. [Chiriapkin AS, Kodonidi IP, Anenko DS. *Razrabotka metodiki kachestvennogo analiza N-atsil'nykh proizvodnykh 2-okso-1-pirrolidinacetamida metodom tonkosloynoi khromatografii*. In: *Razrabotka, issledovanie i marketing novoi farmatsevticheskoi produktsii*. Pyatigorsk: RIA-KMV; **2018**. Issue 73. (in Russ).]
6. Furukawa H, Singh SK, Mancusso R, et al. *Subunit arrangement and function in NMDA receptors*. *Nature*. **2005**;438:185-192. doi: 10.1038/nature04089.
7. Berman HM, Westbrook J, Feng Z, et al. *The Protein Data Bank*. *Nucleic Acids Res*. **2000**;28(1):235-42.
8. Brian J Teppen. *HyperChem, release 2: molecular modeling for the personal computer*. *J. Chem. Inf. Comput. Sci*. **1992**;32(6):757-759. doi: 10.1021/ci00010a025.
9. Thomsen R, Christensen MH. *MolDock: a new technique for high-accuracy molecular docking*. *J. Med. Chem*. **2006**;49(11):3315-3321. doi: 10.1021/jm051197e.
10. *Tri-ibiotech*. Molegro Virtual Docker. URL: <http://www.tri-ibiotech.com>.

Поступила в редакцию 05.03.2019